Chapitre 1 : Réactions acide-Base

I) Les acides et les bases

1) Définitions

En 1923 le chimiste Johannes Brønsted propose une définition d'un acide et d'une base.

Un **acide** est une espèce capable de céder un proton (H^+).
Une **base** est une espèce capable de capter un proton (H^+).

2) Notion de couple acide/base

Par convention, on note l'espèce acide **AH** et sa base conjuguée **A⁻**.
Ils forment un couple acide base noté **AH/A⁻** s'il est possible de passer de l'un à l'autre par transfert d'un ion hydrogène.

La **demi-équation** du couple s'écrit :

Remarque : Le symbole $\rightleftharpoons$ signifie que le transfert peut se faire dans les 2 sens.

Quelques exemples de couples :

Ion oxonium/eau : $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} / \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$

Eau/ion hydroxyde : $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} / \text{HO}^-_{(\text{aq})}$

Acide carbonique/ion hydrogénocarbonate : $\text{H}_2\text{CO}_{3(\text{aq})} / \text{HCO}_3^-_{(\text{aq})}$

Ion hydrogénocarbonate/ion carbonate : $\text{HCO}_3^-_{(\text{aq})} / \text{CO}_3^{2-}_{(\text{aq})}$

Certaines espèces peuvent se comporter à la fois comme des acides et comme des bases.
On les appelle des **amphotères**.
L'amphotère le plus connu est l'eau.

II) Structure et caractère acide ou basique

1) Libération de protons

Pour libérer un proton H^+ , la liaison entre un atome d'hydrogène et le reste de la molécule doit être fortement polarisée. L'hydrogène doit porter une charge partielle positive. Plus la liaison $\text{R} - \text{H}$ est polarisée plus l'atome d'hydrogène peut-être facilement libéré et capté par une base.

2) Les acides carboxyliques

Le groupe carboxyle possède une liaison $\text{O} - \text{H}$ polarisée. L'hydrogène, moins électronégatif, a tendance à quitter la molécule et à devenir H^+ .

La demi-équation acido-basique est :

Remarque : Pour écrire la **demi équation** on utilise une **flèche simple !**

3) Les amines

Les amines sont des composés organiques dérivés de l'ammoniac NH_3 dont au moins un atome d'hydrogène a été remplacé par un groupe carboné.

La liaison $\text{N} - \text{H}$ est polarisée donc l'amine peut être un acide. Cependant l'azote possède un doublet non liant susceptible de capter un H^+ pour former l'ion ammonium.

Une espèce capable de capter un H^+ grâce à un doublet non liant est une **base de Lewis**

La demi-équation acido-basique est :

$\text{R-NH}_3^{+}_{(\text{aq})}$ l'ion ammonium est l'acide et $\text{R-NH}_{2(\text{aq})}$ sa base conjuguée l'amine.

III) Réactions acide/base

Au cours d'une réaction acide-base, l'acide A_1H d'un 1er couple réagit avec la base A_2^- d'un second couple.

L'équation peut s'écrire ainsi :

Remarque : L'équation s'écrit avec une double flèche si la réaction n'est pas totale et avec une simple flèche si la réaction est totale.

A noter : un acide dont la réaction avec l'eau est totale est appelé **acide fort** !

Point méthode par l'exemple :

On étudie la réaction entre l'acide hypochloreux $HClO_{(aq)}$ et l'ammoniac $NH_{3(aq)}$.

Etape 1 : Déterminer les 2 couples mis en jeu. $HClO_{(aq)}/ClO^-_{(aq)}$ et $NH_4^+_{(aq)}/NH_{3(aq)}$

Etape 2 : Ecrire les 2 demi-équations en mettant les réactifs à gauche !

Ici, les réactifs sont $HClO_{(aq)}$ et $NH_{3(aq)}$

Etape 3 : On ajoute "verticalement"

Etape 4 : On simplifie (la flèche se comporte comme un égal en mathématiques)

IV) pH et concentration

L'acidité ou la basicité d'une solution dépendent des valeurs des concentrations en ions oxonium H_3O^+ et hydroxyde HO^- .

Le pH (potentiel Hydrogène) se calcule directement à partir de la concentration en quantité de matière d'ions oxonium.

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^0}\right)$$

Concentration en ions oxonium en mol/L

Réciproquement : $[H_3O^+] = C^0 \times 10^{-pH}$

Concentration standard $C^0 = 1 \text{ mol/L}$

Remarque : Ces relations sont valables pour des concentrations en ion H_3O^+ ou HO^- inférieures à $1.10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

Ainsi, plus le pH augmente, plus la concentration en ions H_3O^+ diminue.